

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Tiempo de carencia	Recomendaciones
Papa 	Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>)	0,250 kg/ha	15 días	Aplicar cada 15 días a partir de los 75-80 días de cultivo (Sudeste Provincia de Buenos Aires).
Vid 	Oidio o Quintal (<i>Oidium tuckeri</i>)	0,5 kg/ha	15 días	Aplicar desde brotes de 15 cm a precierre de racimo.
	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,2 kg/ha		Aplicar desde precierre de racimo hasta 3 semanas pre cosecha.
Duraznero 	ATizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>), Oidiopsis (<i>Leveillula taurica</i>), Stemphyllium (<i>Stemphyllium solanii</i>)	60 g/hl	7 días	Preventivo: aplicar ante la detección de los primeros síntomas.
	Podredumbre morena de los frutales de carozo (<i>Monilia fructicola</i>)	50 g/hl		Se recomienda en general la aplicación a inicio de madurez del fruto (envero) (7-15 días antes del inicio de la cosecha), según maduración por variedad, o con la ocurrencia de frecuentes lluvias o granizo. En San Pedro y zona de influencia, con primaveras húmedas, se recomienda aplicar al inicio de floración.
Tomate 	Mancha gris de la hoja (<i>Stemphyllium solanii</i>), Oidiopsis (<i>Leveillula taurica</i>), Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>)	60 g/hl	15 días	Aplicar en forma preventiva o ante la aparición de primeros síntomas. No realizar más de 3 aplicaciones en el ciclo de cultivo.
Arándano 	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>), Alternaria (<i>Alternaria tenuissima</i>), Colletotrichum (<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>)	1 kg/ha	7 días	Aplicar preventivamente y ante condiciones climáticas predisponentes a las enfermedades. Es importante considerar susceptibilidad varietal. Trabajar bajo esquema de monitoreo "MIE". Aplicar con un volumen de agua de 500 l/ha.
Frutilla 	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75 kg/ha	1 día	Aplicar con condiciones climáticas predisponentes y con un volumen de agua de 400 l/ha.
Maní 	Viruela temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>), Viruela tardía (<i>Cercosporidium personatum</i>), Marchitamiento (<i>Sclerotium rolfsii</i>)	0,35-0,5 kg/ha		Programa de aplicaciones recomendado: 1ª aplicación (Bellis®): aplicar preventivamente a los 60-70 días de emergencia del maní para lograr un mejor control de marchitamiento. 2ª aplicación: 14-21 días de la 1ª aplicación, según condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades (elevada humedad ambiente, lluvias y elevada temperatura). Aplicar Opera® 0,75 l/ha (ver marbete del producto). 3ª aplicación: 21-28 días de la 2ª aplicación (según intensidad de la enfermedad). Aplicar Opera® 0,75 l/ha (ver marbete del producto).